УСПІХ, ГАРАНТОВАНИЙ СЕЛЕКЦІЄЮ СЕСВАНДЕРХАВЕ!

КАТАЛОГ ГІБРИДІВ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ

SESVANDERHAVE

БІАТЛОН 1

БУФФЕЛ 2

ФАЛА 3

ІГУАНА 4

МАНІТУ 5

СІУ 6

БАЛІ 7

КАРПАТИ 8

ТАПІР 9

ТОРЕАДОР 10

ФАЙТЕР 11

ХОРНЕТ 12

АНАКОНДА 13

БОА 14

ПАНДА 15

ПІТБУЛЬ 16

АРГУМЕНТ 17

БІЗОН 18

ХАЙЛЕНД 19

ВАПІТІ 20

ЖИРАФ 21

ПРЕДАТОР 22

СКОРПІОН 23

МАГІСТР 24

ТАЛТОС 25

КОЙОТ 26

www.sv-ukraine.com.ua

НОМАД Смарт

27

ВОМБАТ Смарт

28

КІПУНДЖІ Смарт

29

САНДПАЙПЕР Смарт

30

СПІННЕР Смарт

31

ТЕРРАПІН Смарт

32

convisо® SMART

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІАТЛОН	NZ	-	8	7	6	8	8	9	2021	116	24,3
БУФФЕЛ	NZ	-	8	7	8	6	8	9	2021	118	24,7
ФАЛА	Z	-	8	7	9	9	8	9	2021	115	24
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	8	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	100	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	100	22,6
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20
ВОМБАТ Смарт	N	-	8	7	7	6	7	9	2021	93	22,2
НОМАД Смарт	N	-	7	7	7	6	7	9	2021	94	22,8
КІПУНДЖІ Смарт	N	-	8	7	9	8	7	9	2022	96	22
САНДПАЙПЕР Смарт	Z	-	8	7	9	8	7	9	2022	93	23
СПІННЕР Смарт	N	-	8	7	9	9	6	9	2022	94	22,8
ТЕРРАПІН Смарт	N	9	8	7	9	7	8	9	2022	95	22,8

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
ТАПІР	N	-	7	8	8	9	6	9	2019	112	21,0
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22,0
БОА	N	-	7	7	6	6	5	9	2018	102	23,0
ПІТБУЛЬ	N	9	7	5	5	5	5	9	2018	103	21,0
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19,0
БІАТЛОН	NZ	-	8	7	6	8	8	9	2021	116	24,3
БУФФЕЛ	NZ	-	8	7	8	6	8	9	2021	118	24,7
СІУ	NZ	-	7	7	7	6	6	9	2020	108	23,5
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	7	7	6	9	2019	98	22,4
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24,0
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20,0
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ПАНДА	Z/NZ	-	7	6	7	8	5	9	2018	100	22,2
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21,0
ФАЛА	Z	-	9	7	9	9	8	9	2021	115	24
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
АНАКОНДА	Z	-	6	5	7	7	6	9	2018	99	22,6
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21,0

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.
*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

SESVANDERHAVE

БІАТЛОН НОВИНКА

- ДИПЛОЇД NZ-ТИПУ (НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ФРАНЦІЇ, ХОРВАТІЇ І УКРАЇНІ

- Високопродуктивний: поєднує високу врожайність коренеплодів та цукристість
- Технологічний при переробці
- Стійкий до ризоктонії
- Кращі показники стійкості до рамулярії та ризоманії
- Толерантність до хвороб коренеплоду забезпечує надійне збереження у буртах
- Темно-зелене листя із значним блиском та хвилястістю країв
- Стійкий до хвороб коренеплоду

БУФФЕЛ НОВИНКА

SESVANDERHAVE

- ДИПЛОЇД NZ-ТИПУ (НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В УГОРЩИНІ, УКРАЇНІ

- У період випробування в Україні врожайність перевищила 100т/га
- Стійкий до стеблування
- Високо-технологічний у переробці
- Середня стійкість до афаноміцесу
- Листя світло-зеленого кольору, розміщення – ерективе
- Заглибленість коренеплодів у ґрунті – 85%
- Дуже стійкий до ризоманії, рамулярії, церкоспорозу, та хвороб коренеплоду

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІАТЛОН	**NZ**	**-**	**8**	**7**	**6**	**8**	**8**	**9**	**2021**	**116**	**24,3**
БУФФЕЛ	**NZ**	**-**	**8**	**7**	**8**	**6**	**8**	**9**	**2021**	**118**	**24,7**
ФАЛА	Z	-	8	7	9	9	8	9	2021	115	24
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	8	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	100	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	100	22,6

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

ФАЛА НОВИНКА

- **ДИПЛОЇД Z-ТИПУ (ЦУКРИСТИЙ)**
- **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ РАННІХ ТА СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ**
- **ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ПОЛЬЩІ, УКРАЇНІ**

- Визнання практиками України і Європи
- Висока цукристість та екстрактивність цукру
- Низький вміст K, Na та амінного N
- Кращий по стійкості до афаноміцесу
- Кращі показники стійкості до церкоспорозу, борошнистої роси та ризоманії
- Стійкий до хвороб коренеплоду
- Добре зберігання у кагатах

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІАТЛОН	NZ	-	8	7	6	8	8	9	2021	116	24,3
БУФФЕЛ	NZ	-	8	7	8	6	8	9	2021	118	24,7
ФАЛА	**Z**	**-**	**8**	**7**	**9**	**9**	**8**	**9**	**2021**	**115**	**24**
ІГУАНА	**N**	**-**	**8**	**6**	**8**	**7**	**7**	**9**	**2020**	**111**	**21,8**
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	8	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	100	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	100	22,6

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

ІГУАНА НОВИНКА

- **ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)**
- **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ ТА ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ**
- **ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У БЕЛЬГІЇ, ФРАНЦІЇ, СЕРБІЇ, УКРАЇНІ**

- Стійкість до складних погодних умов (в т.ч. посухи)
- Дуже добра лежкість у кагатах
- Надзвичайно продуктивний
- Висока стійкість до рамуляріозу
- Вдале поєднання високопродуктивності та стійкості до хвороб коренеплоду і листя
- Дуже стійкий до ризоманії, борошнистої роси та церкоспорозу
- Має чудову толерантність до хвороб коренеплоду

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

МАНІТУ НОВИНКА

- **ДИПЛОЇД Z-ТИПУ (ЦУКРИСТИЙ)**
- **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ РАННІХ І СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ**
- **ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В ПОЛЬЩІ, УКРАЇНІ**

- Посухостійкий
- Дуже добра лежкість у кагатах
- Висока цукристість і чистота соку
- Надзвичайно стійкий до церкоспорозу (9)
- Швидке формування коренеплоду і накопичення цукру
- Толерантний до хвороб листя і коренеплоду
- Технологічний при переробці

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІАТЛОН	NZ	-	8	7	6	8	8	9	2021	116	24,3
БУФФЕЛ	NZ	-	8	7	8	6	8	9	2021	118	24,7
ФАЛА	Z	-	8	7	9	9	8	9	2021	115	24
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	**Z**	**-**	**8**	**8**	**9**	**6**	**7**	**9**	**2020**	**106**	**23,7**
СІУ	**NZ**	**-**	**7**	**7**	**8**	**6**	**6**	**9**	**2020**	**108**	**23,5**
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	100	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	100	22,6

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

СІУ НОВИНКА

- **ДИПЛОЇД NZ-ТИПУ (НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)**
- **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ**
- **ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В АВСТРІЇ, СЕРБІЇ І УКРАЇНІ**

- Посухостійкий
- Надзвичайно продуктивний
- Толерантний до хвороб коренеплоду
- Стійкий до ризоманії, борошнистої роси, рамуляріозу та церкоспорозу
- Економне водоспоживання гарантує витримувати посуху
- Коренеплоди відповідають вимогам механізованого збирання
- Відмінна сировина для цукрових заводів

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

SESVANDERHAVE

БАЛІ НОВИНКА

- ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ШВЕЦІЇ, НІДЕРЛАНДАХ, УКРАЇНІ

- нематодостійкий
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до церкоспорозу, ризоманії
- середня стійкість до борошнистої роси, рамуляріозу
- дружні сходи
- високий потенціал збору цукру

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІАТЛОН	NZ	-	8	7	6	8	8	9	2021	116	24,3
БУФФЕЛ	NZ	-	8	7	8	6	8	9	2021	118	24,7
ФАЛА	Z	-	8	7	9	9	8	9	2021	115	24
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	8	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	**N**	**9**	**7**	**6**	**8**	**6**	**6**	**9**	**2019**	**105**	**21,4**
КАРПАТИ	**NZ**	**-**	**7**	**8**	**8**	**7**	**6**	**9**	**2019**	**100**	**22,4**
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	100	22,6

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

КАРПАТИ НОВИНКА

SESVANDERHAVE

- ДИПЛОЇД NZ-ТИПУ (НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В УГОРЩИНІ, СЛОВАЧЧИНІ, УКРАЇНІ

- посухостійкий
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- стійкий до стеблування
- високопродуктивний по масі коренеплоду та цукру

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

SESVANDERHAVE

ТАПІР НОВИНКА

- ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ПОЛЬЩІ, УКРАЇНІ

- посухостійкий
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, ризоманії
- середня стійкість до рамуляріозу
- висока стійкість до складних погодніх умов
- висока енергія росту рослин

ТОРЕАДОР НОВИНКА

SESVANDERHAVE

- ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В УГОРЩИНІ, СЛОВАЧЧИНІ, УКРАЇНІ

- посухостійкий
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- стійкий до стеблування
- високоврожайний

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІАТЛОН	NZ	-	8	7	6	8	8	9	2021	116	24,3
БУФФЕЛ	NZ	-	8	7	8	6	8	9	2021	118	24,7
ФАЛА	Z	-	8	7	9	9	8	9	2021	115	24
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	8	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	100	22,4
ТАПІР	**N**	**-**	**7**	**8**	**5**	**6**	**5**	**9**	**2019**	**112**	**21**
ТОРЕАДОР	**N**	**-**	**8**	**8**	**7**	**7**	**5**	**9**	**2019**	**114**	**22**
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	100	22,6

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20

*** Потенціал по врожайності кореноплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

ФАЙТЕР НОВИНКА

- ДИПЛОЇД NZ-ТИПУ (НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ПОЛЬЩІ, УКРАЇНІ

- високооцінений виробничниками Європи
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, ризоманії
- середня стійкість до рамуляріозу
- стійкий до стеблування
- технологічний при переробці

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІАТЛОН	NZ	-	8	7	6	8	8	9	2021	116	24,3
БУФФЕЛ	NZ	-	8	7	8	6	8	9	2021	118	24,7
ФАЛА	Z	-	8	7	9	9	8	9	2021	115	24
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	8	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	100	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	**NZ**	**-**	**7**	**6**	**8**	**8**	**6**	**9**	**2019**	**96**	**22,4**
ХОРНЕТ	**NZ**	**-**	**8**	**6**	**7**	**7**	**5**	**9**	**2019**	**98**	**24**
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	100	22,6

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

ХОРНЕТ НОВИНКА

- ДИПЛОЇД NZ-ТИПУ (НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, УКРАЇНІ

- високопродуктивний по масі коренеплоду та цукру
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- швидке змикання рядків
- низький вміст альфа-амінного азоту

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

АНАКОНДА

- ДИПЛОЇД Z-ТИПУ (ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ РАННІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ФРАНЦІЇ, УКРАЇНІ

- високопродуктивний по масі коренеплоду та цукру
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до ризоманії
- висока стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- стійкий до стеблування
- технологічний при переробці

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІАТЛОН	NZ	-	8	7	6	8	8	9	2021	116	24,3
БУФФЕЛ	NZ	-	8	7	8	6	8	9	2021	118	24,7
ФАЛА	Z	-	8	7	9	9	8	9	2021	115	24
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	8	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	100	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	**Z**	**-**	**6**	**6**	**8**	**7**	**6**	**9**	**2018**	**100**	**22,6**

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

БОА

- ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ФРАНЦІЇ, ТУРЕЧЧИНІ, УКРАЇНІ

- посухостійкий, високооцінений виробничниками Європи
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- стійкий до ризоктонії
- високопродуктивний

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БОА	**N**	**-**	**7**	**8**	**6**	**6**	**5**	**9**	**2018**	**102**	**23**
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20

*** Потенціал по врожайності кореневого коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

ПАНДА

- ДИПЛОЇД Z/NZ-ТИПУ (ЦУКРИСТИЙ, НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ РАННІХ ТА СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ФРАНЦІЇ, ТУРЕЧЧИНІ, УКРАЇНІ

- високопродуктивний по масі коренеплоду та цукру
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, ризоманії
- середня стійкість до рамуляріозу
- стійкий до стеблування
- висока оцінка цукроварів

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІАТЛОН	NZ	-	8	7	6	8	8	9	2021	116	24,3
БУФФЕЛ	NZ	-	8	7	8	6	8	9	2021	118	24,7
ФАЛА	Z	-	8	7	9	9	8	9	2021	115	24
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	8	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	100	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	100	22,6

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

ПІТБУЛЬ

- ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, НІДЕРЛАНДАХ, УКРАЇНІ

- нематодостійкий
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- дружні сходи
- високий потенціал врожайності на інфікованих нематодою полях

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	**Z/NZ**	**-**	**7**	**7**	**8**	**7**	**5**	**9**	**2018**	**100**	**22,2**
ПІТБУЛЬ	**N**	**9**	**7**	**7**	**8**	**5**	**5**	**9**	**2018**	**103**	**21**
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

АРГУМЕНТ

- ДИПЛОЇД Z/NZ-ТИПУ (ЦУКРИСТИЙ, НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ РАННІХ ТА СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ПОЛЬЩІ, УКРАЇНІ

- високопродуктивний по масі коренеплоду та цукру
- добра лежкість у кагатах
- добрий баланс між урожайністю і стійкістю до церкоспорозу
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- стійкий до стеблування
- високий потенціал

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІАТЛОН	NZ	-	8	7	6	8	8	9	2021	116	24,3
БУФФЕЛ	NZ	-	8	7	8	6	8	9	2021	118	24,7
ФАЛА	Z	-	8	7	9	9	8	9	2021	115	24
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	8	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	100	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	100	22,6

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

БІЗОН

- ДИПЛОЇД N/NZ-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У НІДЕРЛАНДАХ, УКРАЇНІ

- нематодостійкий
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- висока енергія росту рослин
- високий потенціал незалежно від ступеню ураження поля буряковою нематодою

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	**Z/NZ**	**-**	**5**	**5**	**8**	**6**	**6**	**9**	**2016**	**100**	**20,8**
БІЗОН	**N/NZ**	**9**	**7**	**5**	**6**	**6**	**5**	**9**	**2015**	**101**	**19,7**
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

ХАЙЛЕНД

- ДИПЛОЇД NZ-ТИПУ (НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ДАНІЇ, СЕРБІЇ, УКРАЇНІ

- високопродуктивний по масі коренеплоду та цукру
- добра лежкість у кагатах
- кращий гібрид 2015 року
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- висока енергія росту рослин
- високий потенціал

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІАТЛОН	NZ	-	8	7	6	8	8	9	2021	116	24,3
БУФФЕЛ	NZ	-	8	7	8	6	8	9	2021	118	24,7
ФАЛА	Z	-	8	7	9	9	8	9	2021	115	24
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	8	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	100	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	100	22,6

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

ВАПІТІ

- ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ЛИТВІ, УГОРЩИНІ, УКРАЇНІ

- швидкий ріст коренеплоду у другій половині вегетації
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до ризоманії, борошнистої роси
- середня стійкість до церкоспорозу, рамуляріозу
- дружні сходи
- сорт стабільний

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	**NZ**	**-**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**9**	**2015**	**106**	**20,4**
ВАПІТІ	**N**	**-**	**6**	**5**	**6**	**9**	**6**	**9**	**2014**	**101**	**19,5**
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

ЖИРАФ

- **ДИПЛОЇД Z-ТИПУ (ЦУКРИСТИЙ)**
- **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ РАННІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ**
- **ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У БЕЛЬГІЇ, ФРАНЦІЇ, ПОЛЬЩІ, ХОРВАТІЇ, ТУРЕЧЧИНІ, УКРАЇНІ**



- посухостійкий
- добра лежкість у кагатах
- коренеплід ширококонічної форми повністю заглиблений у грунт
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- висока енергія росту рослин
- високий потенціал

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІАТЛОН	NZ	-	8	7	6	8	8	9	2021	116	24,3
БУФФЕЛ	NZ	-	8	7	8	6	8	9	2021	118	24,7
ФАЛА	Z	-	8	7	9	9	8	9	2021	115	24
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	8	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	100	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	100	22,6

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

ПРЕДАТОР

- **ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)**
- **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ**
- **ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У СЛОВАКІЇ, ХОРВАТІЇ, ЧЕХІЇ, УГОРЩИНІ, УКРАЇНІ**

- високопродуктивний
- добра лежкість у кагатах
- крупний коренеплід повністю заглиблений у грунт, швидке наростання маси у другій половині вегетації
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- висока енергія росту рослин
- сорт стабільний

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	**Z**	**-**	**5**	**7**	**6**	**7**	**6**	**9**	**2014**	**97**	**20,8**
ПРЕДАТОР	**N**	**-**	**5**	**5**	**5**	**7**	**5**	**9**	**2014**	**103**	**19**
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

СКОРПІОН

- ДИПЛОЇД NZ-ТИПУ (НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У НІДЕРЛАНДАХ, ЧЕХІЇ, БЕЛЬГІЇ, ЛИТВІ, УКРАЇНІ

- посухостійкий
- добра лежкість у кагатах
- крупний коренеплід повністю заглиблений у грунт
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- технологічний при переробці , схвалений фермерами Європи
- високопродуктивний по масі коренеплоду та цукру

МАГІСТР

- ДИПЛОЇД Z/NZ-ТИПУ (ЦУКРИСТИЙ, НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ РАННІХ ТА СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В УГОРЩИНІ, УКРАЇНІ

- посухостійкий
- добра лежкість у кагатах
- висока енергія росту рослин навіть в умовах холодної весни
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- стійкий до стеблування
- технологічний при переробці

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІАТЛОН	NZ	-	8	7	6	8	8	9	2021	116	24,3
БУФФЕЛ	NZ	-	8	7	8	6	8	9	2021	118	24,7
ФАЛА	Z	-	8	7	9	9	8	9	2021	115	24
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	8	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	100	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	100	22,6

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	**NZ**	**-**	**5**	**7**	**6**	**6**	**6**	**9**	**2014**	**99**	**19,6**
МАГІСТР	**Z/NZ**	**-**	**5**	**7**	**7**	**6**	**6**	**9**	**2012**	**106**	**21**
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

ТАЛТОС

- ДИПЛОЇД Z-ТИПУ (ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ РАННІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В УГОРЩИНІ, УКРАЇНІ

- посухостійкий
- добра лежкість у кагатах
- кращий для вирощування у стресових умовах
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- стійкий до стеблування
- технологічний при переробці

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІАТЛОН	NZ	-	8	7	6	8	8	9	2021	116	24,3
БУФФЕЛ	NZ	-	8	7	8	6	8	9	2021	118	24,7
ФАЛА	Z	-	8	7	9	9	8	9	2021	115	24
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	8	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	100	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	100	22,6

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

КОЙОТ

- ДИПЛОЇД NZ-ТИПУ (НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В НІДЕРЛАНДАХ, БЕЛЬГІЇ, НІМЕЧЧИНІ, ІТАЛІЇ, УГОРЩИНІ, ЧЕХІЇ, ТУРЕЧЧИНІ, УКРАЇНІ

- посухостійкий
- добра лежкість у кагатах
- поєднує високу врожайність та цукристість
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- висока енергія росту рослин
- високий потенціал, незалежно від природних зон

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	**Z**	**-**	**6**	**7**	**7**	**6**	**6**	**9**	**2012**	**99**	**21**
КОЙОТ	**NZ**	**-**	**5**	**7**	**6**	**6**	**6**	**9**	**2010**	**96**	**20**

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

ВОМБАТ СМАРТ

- ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ ТА ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- СУЧАСНА ПРАКТИКА КОНТРОЛЮ БУР'ЯНІВ КОНВІЗО® СМАРТ (НОВА ГЕНЕРАЦІЯ АЛС–СТІЙКИХ ГІБРИДІВ)
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В ЄВРОПІ І УКРАЇНІ

- Гарантує високий врожай коренеплодів, на полях, уражених ризоктонією
- Середня стійкість до афаноміцису
- Листя темно-зелене, з невеликим блиском, із незначною хвилястістю країв, толерантне до церкоспори
- Зануреність коренеплодів у ґрунті – 87%
- Дуже добра лежкість коренеплодів в кагатах (стійкий до кореневих гнилей)
- Високотехнологічний у переробці
- Гібрид дуже стійкий до ризоктонії

НОМАД СМАРТ

- ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ ТА ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- СУЧАСНА ПРАКТИКА КОНТРОЛЮ БУР'ЯНІВ КОНВІЗО® СМАРТ (НОВА ГЕНЕРАЦІЯ АЛС–СТІЙКИХ ГІБРИДІВ)
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В ЄВРОПІ І УКРАЇНІ

- Дуже високоврожайний
- Забезпечує стабільний збір цукру
- Технологічна сировина (низький вміст розчинних зольних речовин)
- Стійкий до ризоманії
- Середня толерантність до афаноміцесу
- Добра стійкість до хвороб коренеплоду
- Добре зберігання у кагатах

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ВОМБАТ Смарт	**N**	**-**	**8**	**7**	**7**	**6**	**7**	**9**	**2021**	**93**	**22,2**
НОМАД Смарт	N	-	7	7	7	6	7	9	2021	94	22,8
КІПУНДЖІ Смарт	N	-	8	7	9	8	7	9	2022	96	22
САНДПАЙПЕР Смарт	Z	-	8	7	9	8	7	9	2022	93	23
СПІННЕР Смарт	N	-	8	7	9	9	6	9	2022	94	22,8
ТЕРРАПІН Смарт	N	9	8	7	9	7	8	9	2022	95	22,8

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ВОМБАТ Смарт	N	-	8	7	7	6	7	9	2021	93	22,2
НОМАД Смарт	**N**	**-**	**7**	**7**	**7**	**6**	**7**	**9**	**2021**	**94**	**22,8**
КІПУНДЖІ Смарт	N	-	8	7	9	8	7	9	2022	96	22
САНДПАЙПЕР Смарт	Z	-	8	7	9	8	7	9	2022	93	23
СПІННЕР Смарт	N	-	8	7	9	9	6	9	2022	94	22,8
ТЕРРАПІН Смарт	N	9	8	7	9	7	8	9	2022	95	22,8

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

КІПУНДЖІ СМАРТ

- **ТИП ГІБРИДУ: N (УРОЖАЙНИЙ)**
- **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ ТА ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ**
- **СУЧАСНА ПРАКТИКА КОНТРОЛЮ БУР'ЯНІВ КОНВІЗО® СМАРТ (НОВА ГЕНЕРАЦІЯ АЛС–СТІЙКИХ ГІБРИДІВ)**
- **ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В ЧЕХІЇ, УГОРЩИНІ, СЕРБІЇ, ХОРВАТІЇ, ІТАЛІЇ, БІЛОРУСІ, МОЛДОВІ, УКРАЇНІ**

- Диплоїдний, дуже високоврожайний гібрид
- Здоровий листовий апарат забезпечує стабільне накопичення цукру
- Відмінний для цукроваріння (низький вміст розчинних зольних речовин)
- Стійкий до ризоманії, церкоспорозу, ризоктонії, афаноміцесу та борошнистої роси
- Бал стійкості до рамулярії 7 (70%)
- Висока стійкість до хвороб коренеплоду
- Добре зберігання у кагатах

САНДПАЙПЕР СМАРТ

- **ДИПЛОЇД ЦУКРИСТОГО ТИПУ (Z- ТИП)**
- **СУЧАСНА ПРАКТИКА КОНТРОЛЮ БУР'ЯНІВ КОНВІЗО® СМАРТ (НОВА ГЕНЕРАЦІЯ АЛС–СТІЙКИХ ГІБРИДІВ)**
- **ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В ДАНІЇ, ФРАНЦІЇ, БРИТАНІЇ, ІТАЛІЇ, НІДЕРЛАНДАХ, ПОЛЬЩІ, ШВЕЦІЇ, ФІНЛЯНДІЇ І УКРАЇНІ**

- Висока цукристість у поєднанні з продуктивністю забезпечують стабільно-високий збір цукру
- Еталон технологічної сировини завдяки низькому вмісту розчинних зольних речовин та кращим показникам чистоти соку
- Стійкий до ризоманії, церкоспорозу, ризоктонії, афаноміцесу та борошнистої роси
- Толерантність до рамулярії – вище середньої (7 балів)
- Висока стійкість до хвороб коренеплоду (90%)
- Добрі агротехнічні властивості при викопуванні
- Для ранніх та середніх строків збирання

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ВОМБАТ Смарт	N	-	8	7	7	6	7	9	2021	93	22,2
НОМАД Смарт	N	-	7	7	7	6	7	9	2021	94	22,8
КІПУНДЖІ Смарт	**N**	**-**	**8**	**7**	**9**	**8**	**7**	**9**	**2022**	**96**	**22**
САНДПАЙПЕР Смарт	Z	-	8	7	9	8	7	9	2022	93	23
СПІННЕР Смарт	N	-	8	7	9	9	6	9	2022	94	22,8
ТЕРРАПІН Смарт	N	9	8	7	9	7	8	9	2022	95	22,8

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ВОМБАТ Смарт	N	-	8	7	7	6	7	9	2021	93	22,2
НОМАД Смарт	N	-	7	7	7	6	7	9	2021	94	22,8
КІПУНДЖІ Смарт	N	-	8	7	9	8	7	9	2022	96	22
САНДПАЙПЕР Смарт	**Z**	**-**	**8**	**7**	**9**	**8**	**7**	**9**	**2022**	**93**	**23**
СПІННЕР Смарт	N	-	8	7	9	9	6	9	2022	94	22,8
ТЕРРАПІН Смарт	N	9	8	7	9	7	8	9	2022	95	22,8

*** Потенціал по врожайності кореннеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

SESVANDERHAVE

conviso SMART

СПІННЕР СМАРТ

- ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)
- СУЧАСНА ПРАКТИКА КОНТРОЛЮ БУР'ЯНІВ КОНВІЗО® СМАРТ (НОВА ГЕНЕРАЦІЯ АЛС–СТІЙКИХ ГІБРИДІВ)
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В ІСПАНІЇ, ХОРВАТІЇ, ІТАЛІЇ, СЕРБІЇ І УКРАЇНІ

- Нова генерація високоврожайних гібридів
- Технологічна сировина (при переробці забезпечує високий вихід цукру)
- Стійкий до ризоманії, церкоспорозу, ризоктонії, афаноміцесу та борошнистої роси
- Толерантність до рамулярії – вище середньої (6 балів)
- Висока стійкість до хвороб коренеплоду забезпечує гарантоване зберігання у кагатах
- Добрі агротехнічні властивості при викопуванні
- Для середньо-пізніх строків збирання

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ВОМБАТ Смарт	N	-	8	7	7	6	7	9	2021	93	22,2
НОМАД Смарт	N	-	7	7	7	6	7	9	2021	94	22,8
КІПУНДЖІ Смарт	N	-	8	7	9	8	7	9	2022	96	22
САНДПАЙПЕР Смарт	Z	-	8	7	9	8	7	9	2022	93	23
СПІННЕР Смарт	**N**	**-**	**8**	**7**	**9**	**9**	**6**	**9**	**2022**	**94**	**22,8**
ТЕРРАПІН Смарт	N	9	8	7	9	7	8	9	2022	95	22,8

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

SESVANDERHAVE

conviso SMART

ТЕРРАПІН СМАРТ

- ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ ТА ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- СУЧАСНА ПРАКТИКА КОНТРОЛЮ БУР'ЯНІВ КОНВІЗО® СМАРТ (НОВА ГЕНЕРАЦІЯ АЛС–СТІЙКИХ ГІБРИДІВ)
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В ЄВРОПІ І УКРАЇНІ

- Нематодотолерантний
- Високопродуктивний диплоїд
- Енергійний розвиток сходів
- Відмінні показники чистоти соку
- Стійкий до ризоманії, церкоспорозу, ризоктонії, афаноміцесу.
- Толерантність до борошнистої роси – 7, до рамулярії – 8 (80%)
- Висока стійкість до хвороб коренеплоду
- Добрі агротехнічні властивості при викопуванні (мале налипання грунту)
- Рекомендується для середніх та пізніх строків збирання

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ВОМБАТ Смарт	N	-	8	7	7	6	7	9	2021	93	22,2
НОМАД Смарт	N	-	7	7	7	6	7	9	2021	94	22,8
КІПУНДЖІ Смарт	N	-	8	7	9	8	7	9	2022	96	22
САНДПАЙПЕР Смарт	Z	-	8	7	9	8	7	9	2022	93	23
СПІННЕР Смарт	N	-	8	7	9	9	6	9	2022	94	22,8
ТЕРРАПІН Смарт	**N**	**9**	**8**	**7**	**9**	**7**	**8**	**9**	**2022**	**95**	**22,8**

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

Комерційний директор
Горобець Сергій Володимирович,
Тел. (095) 286 70 28
E-mail: Sergiy.Gorobetz@sesvanderhave.com

Директор з виробництва насіння
Гацула Віктор Гаврилович
Тел. (050) 310 44 66
E-mail: Viktor.Gatsula@sesvanderhave.com

Агроном
Дучак Сергій Володимирович
Тел. (050) 444 50 97
E-mail: Sergiy.Duchak@sesvanderhave.com

Технічний консультант
Козій Василь Євгенович, к.с.-г.н.,
Тел. (050) 351 31 41
E-mail: Vasyl.Koziy@sesvanderhave.com

Головний технолог
Марченко Станіслав Іванович, к.с.-г.н.,
Тел. (095) 276 51 85
E-mail: Stanislav.Marchenko@sesvanderhave.com

Завідувач лабораторії якості насіння
Шевченко Костянтин Костянтинович
Тел. (095) 282 04 10
E-mail: Kostyantyn.Shevchenko@sesvanderhave.com

www.sv-ukraine.com.ua

ГЕНЕРАЦІЇ СЕСВАНДЕРХАВЕ

SESVANDERHAVE

ТОВ «Сесвандерхаве-Україна»:
03083, м. Київ,
проспект Науки, 54-Б, офіс 7
Тел./факс (044) 502-93-66, (044) 502-93-67
www.sv-ukraine.com.ua